

FLYER - VELDEXCURSIE GROENBEMESTER 25 SEPTEMBER 2024 - Welke Groenbemester past bij jou?



no	Naam	Samenstelling	Belangrijkste eigenschappen	Zaaiadvies en kosten	Toelichting	Opletten bij	Reden/Ziekte/Plagen
1	Optima Rapide NL	Alexandrijnse klaver, Phacelia, Tuinkers, Deder, Niger, Vlas	Snelle groei, goede bodembedekking	32,5 kg/ha, zaaien tot half september Bio: €5,81 Gb: €4,72	Geschikt voor fijnzadige gewassen; minimale bewerkingen nodig.	Vermeerdering van slakken	
2	Inkarnaat Klaver	-	Rijk aan stikstof, goede bodembedekking, vlinderbloemige	25 kg/ha, zaaien van maart tot juli Bio: €6,30 GB: €4,73	Inkarnaat klaver is goed voor stikstofbinding en kan helpen bij het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.	Rotatie met erwten, bonen	Gevoelig voor wortelknobbelaaltjes die ook erwten en bonen aantasten.
3	Optima Vroeg	Soedangras, Vezelhennepe, Alexandrijnse klaver, Zomertiticaal, Zomerveldboon, Zomerwikke, Zonnebloem	Vroeg in het seizoen te zaaien, snelle bodembedekking	75 kg/ha, zaaien van half mei tot juli Bio: €3,06	Speciaal ontwikkeld voor vroege zaai, biedt bescherming tegen erosie.	Vermeerdering van trips	
4	Landberger Gemenge plus	29% Inkarnaat klaver, 49% Italiaans raaigras, 19% Winterwikken, 3% perzische klaver	Hoog opbrengend, stikstofbinding, goede voederwaarde	60 kg/ha, optimale uitzaai tot eind september Bio: €4,69 Gb: €3,58	Geschikt voor zowel voederdoeleinden als groenbemesting, verbetert bodemstructuur en regenwormactiviteit.	-	-
5	Teralife Solanum Organic	10% Alexandrijnse klaver, 20% Hybride klaver, 15% Perzische klaver, 18% Facelia	Biologisch, verbetert bodemstructuur, stikstofbinding	30-35 kg/ha, optimale uitzaai 15 juli tot eind augustus.	Verbetert de bodemstructuur en bevordert stikstofbinding, geschikt voor biologische landbouw.	Vermeerdering van slakken	Gevoelig voor slakken.
6	Phacelia	-	Snelle groei, goede onkruidonderdrukking, bijvriendelijk	10+ kg/ha, zaaien van maart tot september Bio: €6,70 Gb: €6,51	Phacelia is populair vanwege zijn snelle groei en het vermogen om onkruid te onderdrukken.	Rotatie met aardappelen	Kan als waardplant dienen voor bepaalde aaltjes die schadelijk zijn voor aardappelen.
7	Optima Autumn	Zomerhaver, Gele mosterd	Geschikt voor late zaai, goede bodembedekking	85 kg/ha, zaaien van juli tot oktober. Bio: €1,87,-	Ontwikkeld voor late zaai, biedt bescherming tegen winterse omstandigheden.	-	-

8	Stoppelknol	-	Snelle groei, goede bodembedekking, verbetert bodemstructuur	6 kg/ha, zaaien van juli tot augustus Gb: €17,05	Stoppelknol is effectief in het verbeteren van de bodemstructuur en het bieden van snelle bodembedekking.	Rotatie met koolgewassen	Gevoelig voor knolvoet, een ziekte die ook koolgewassen aantast.
9	Pannonische Wikke	-	Rijk aan stikstof, vlinderbloemige, goede bodembedekking	90-125 kg/ha, zaaien van maart tot juli Gb: €3,23	Wikken zijn goed voor stikstofbinding en kunnen helpen bij het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.	Rotatie met erwten, bonen	Gevoelig voor dezelfde ziektes als andere vlinderbloemigen, zoals wortelknobbelaaltjes.
10	Optima Sola	Alexandrijnse klaver, Deder, Vlas, Niger, Tillage radish, Zomerwikke, Zomerhaver (gb japanse haver)	Geschikt voor specifieke bodemomstandigheden	40,2 (gb) 50,5 (bio) kg/ha, zaaien tot half september Bio: €3,18 Gb: €3,77	Geschikt voor teelten zoals aardappelen, peen, pompoen; goed te beheren met niet-kerende grondbewerking of ondiep ploegen.	-	-
11	Bladrammenas	-	Snelle groei, goede bodembedekking, onderdrukt onkruid	25 kg/ha, zaaien van juli tot september. Bio: €5,21 Gb: €3,44	Geschikt voor het breken van verdichte lagen in de bodem; kan nematodenpopulaties verminderen.	Rotatie met koolgewassen	Gevoelig voor knolvoet, een ziekte die ook koolgewassen aantast.

Groenbemester mengsel Arjen van Buuren

no	Naam	Samenstelling	Belangrijkste eigenschappen	Zaaiadvies en kosten	Toelichting	Opletten bij	Reden/Ziekte/Plagen
1	Groenbemester fijn 10kg/ha (a van Buuren) + Groenbemester grof 40kg/ ha	Alexandrijnse klaver, Zomerkoolzaad, Rode klaver, Facelia, Niger, Tillage radisch, Bladkool, Zwaardherik, Ethiopische mosterd, Bladrammenas, Deder, Stoppelknollen, Sorghum, Lijnzaad, Spurrie, <i>Haver</i> , <i>Zomertarwe</i> , <i>Hennep</i> , <i>Zomerveldboon</i> , <i>Zonnebloemen</i> , <i>Zomergerst</i>	Door de verschillende soorten in het mengsel, ieder met hun eigen wortelarchitectuur, worden de verschillende lagen in de bodem optimaal doorworteld en is de totale biomassa groter dan bij een monocultuur. Ook scheiden de verschillende soorten wortels hun eigen exudaten (suikers) uit, wat een divers en actief bodemleven stimuleert.	Fijn zaad 10 kg per ha, grof zaad 40 kg per ha. Zaaien in één werkgang op 2 verschillende dieptes.	Speciaal ontwikkeld voor stimuleren biodivers bodemleven en toevoer van effectieve organische stof tot 1000kg	Rotatie met peulvruchten en brassica's	Waardplanten, aaltjes en knolvoet